## 庫全書

子部

欽定四庫全書發為準級卷二十四

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院吏月臣周世泰 校對官中書臣宋枋遠總校官進士臣朱 鈴

腾録監生臣李 ፉ

**更足回事亡与** CHANGE THE PARTY OF THE PARTY O 1 CONTRACT PROPERTY. 強治準絕 消食 撰

**薑橘湯**活 橘皮半夏湯元 水 服 右量水多少煎至七分服 右叹咀水五鍾煎至二大鍾去浑分三服食後臨 陳皮去 橘皮法生薑 鍾煎七分 治嘔噦手足逆 半夏松二生薑 治積氣痰痞不下飲食嘔吐不 三切 錢片 各 雨 止 卧

半夏生薑大黃湯 治反胃 水煮金花九鬼 次記日華心島 男 半夏二升洗人参三白塞十大半夏湯井 治胃反呕吐 以水一斗三升和蜜揚之二百四十遍煮藥取三 水五升煮取三升分温再服 半夏配生畫一两大黃四 嘔吐 強治準绳 紫沉九見唱

金片口后人重 治中湯即理中湯加陳皮青皮等分 一陳湯見及 升温服一升餘分再服 看具菜更湯東 石爲細末每服半兩水二盏煎至一 杏 麻北當歸 呉茱萸 甘草治 草豆蔻 **.** 各五 一钱柴胡 治嘔吐喘胃寒所致 卷二十四 人參 半夏 理中湯見電 尨术 茯苓 盛去查食前執 黄芩钱 轧薑

霍香安胃散車 |温中湯即理中湯加丁香 次足四軍全書 鐵刷湯見思 右為細末每服二錢水二盞生薑三片同煎至一盞 熟 去查凉服食前和查服亦可 服忌冷物 藿香十 致丁香 治脾胃虚弱不進飲食嘔吐不待腐 強治準絕 人参钱 橘红五

金プロガノア 紅豆丸 猪苓散 服 右為細末薑汁糊九早角子大每服一九以大棗 枝去核填藥麵裹煨熟去麵細嚼白湯下空心日三 **柴胡湯**鬼往來 丁香 猪苓 景 治諸嘔逆膈氣及胃吐食 胡椒 茯苓 砂仁 白术 各等 紅豆各 四 粒 †

といううとう 新法半夏湯和 呉朱萸湯見傷 馬寬中湯俱見 肋脹痞頭旋惡心不思飲食 縮砂仁 湯俟 杆為散飲服方寸七日三服 香 頓轧 兩 大半夏本一兩沸湯浸各半大半夏四兩湯洗七次 寒吐 轧片 反胃 神勉以陳皮出草葉仁西 白豆蔻仁 為切 **赤薑汁拌成作兩片薑汁** 治脾胃氣弱痰飲 枳南湯見四 半夏寫心湯 證治準絕 八月一晝夜 痞 不散嘔逆酸 又一晝 夜洗, **導痰湯見痰** 香透膈湯 陽 甘草生半炙 白礬 去 礬

靈砂 **到厅四月全書** 攂 鹽湯一 敗服 古為細末每服二錢先用生薑自然汁調成膏 「四月全書」 **右炒鹽一斤同樂炒為細末每服** 麻油 五臟助元氣 不拘時點 兩良薑 治上盛 服 下虚痰涎壅盛最能鎮墜升 茴香 馢 不拘時白湯 兩

竹如湯事 灰色日奉在馬 正丹親 粉冷滑之物 米糊九如麻子大每服三九空心聚湯米飲井花水 右二味用新銚内炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯 參湯任下量病輕重增至五七九 思猪羊血菜豆 乾萬 水銀 硫黄 治胃熱嘔 菱菱耗汁 強治準緩 半硫九見大 益 漿 水 钱 人州甘草 钱

槐花散き 金发巴压冷量 枇杷葉飲本 校同煎至七分去查温服 膈熱涎有殊效 **右為末每服五錢水一鍾畫三片竹茹一彈大東** 右各等分為末每服二錢白湯調下 早角生皮焼 枇杷葉二銭 大凡吐多是腸熱熱且生痰此藥能化胃 止嘔吹和中利膈 白馨於沸棍花點色甘草矣 多 ø

漏氣麥門冬湯三 ここううしょう 有是證 焦之氣慓悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故 水煎去查入檳榔末五分和匀服 右到散每服四大錢水一盞半薑五片陳米 畫片七 麥門冬以生蘆根 治漏氣因上焦傷風開其腠理上 陳皮 證治準絕 菱鞋各三 白木品五甘草 撮煎

多方匹厚全書 走哺人参湯三 吐食桔梗湯珍 七分去淬热服 回腸注于膀胱井與胃傳糟粕而下大腸今大小 **右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓温服** 通故知下焦實熱之所為也 竹茹 白术 黄芩 治走哺盖下焦氣起于胃下口別 治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪 栀子仁 和 母 菱鞋 陳皮各半石膏城 茯苓餐 蘆根

荆黄湯你 木香散 たこういという 大承氣湯見大 右為細末前藥調服 石雕末每服 桔梗 木香 厚朴蓋製炒香 不通 檳榔谷等 白术的十年夏她一陳皮生枳實以白花 治證同桔梗湯 便 雨水一盃煎至七分取清温服 證治準経

金万四月白世 檳榔散 紫沉九 錢空心服 **右為細末同煎藥** 每服二十九食後服 廳末作 荆芥 檳榔 古潔 钱木香 兩 治 服水二盏煎至 中焦吐食由食精與寒氣相格故吐而疼 钱甘草 軽粉 亦用水浸蒸餅為丸如小豆 我大黄 許少 盖去查調檳榔散

欠足四事在馬 燒令熟去外麵煎湯下紫沉丸一百九一日二服後 大便過至不吐則止此主寒積氣病机有代格 食用稿皮一箇浸少時去白裹生薑一塊麵裹紙封 五十九食後薑湯下愈則止小兒另九一法反胃吐 右為細末入巴豆霜令勻醋糊為九如黍米大每腿 杏 巴豆霜各五分 杏仁生 半夏麵多 义 白术 證治準絕 烏梅娃丁香 木香錢 陳皮 致白豆蔻 檳榔钱 石

金花九法 金矢四尾石雪 **大黃甘草湯** 脾胃之虚宜治風安胃 水三升煮取一升分温再服 下從少至多漸次服之以吐止為度 細末薑汁浸蒸餅為九如桐子大小兒另九薑 半夏湯洗檳榔 大黄丽甘草而 治吐食而脉弦者由肝勝於脾而吐乃由 置全 錢雄黃 一錢

青鎮丸 欠足口事 产馬 茯苓澤瀉湯鱼 右細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服五十九薑湯下 右以水一斗煮取三升内澤寫再煮取二升半温服 八合日叁服 柴胡 半 茯苓 伴澤寫四甘草 四桂枝 四生薑四白水 \_ 錢 治嘔吐脈弦頭痛而有汗 南黄本北 對草 證治準經 兩

茯苓半夏湯妆 乾嘔陳皮湯 金グログとつき 惡心生薑半夏湯金 冷分肆服日三夜 水七升煮取三升温服 以水三升煮半夏取二升內生薑汁煮取 半夏井生薑 陳皮四生薑牛 匮金 斤 服止停後服 下咽即愈

柴胡半夏湯妆 大三日年 八十五 查熱服 右為廳末每服五錢水二盞生薑五片煎至 右為麤末水二盞煎至五沸去查温服 炒麵 升麻谷五白茯苓か 半夏 美萬木 钱大麥聚 兩各 少半两陳皮 炒趟 谁治準絕 生薑 片柴胡 天麻钱二白术 豪本 一盏去 白

四門九丹 金为四月万重 **吐酸八味平胃散** 石為細末麵糊丸桐子大 每服肆錢水一盏煎七分空心熱服 厚 壁雨 泥細 朴主设升麻 选炒甘草 《 為 為 樂 问 to 支 師 見 收 自 黄芩 好 各 倉木 炒用 因 射干沒沒茶两半大黃慈 两半

神术九事 欠已日奉 上馬 去矣 作如潦水之有科臼不盈科則不行也脾土惡濕而 服覺燥以山梔末 右以舊术焙髡為末然後以芝蔴漿及東肉和勻杵 水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以堆科臼則疾當 苕木 如梧桐子大每服五十九温湯下忌桃李雀蛤初 **泔浸** 治停飲成癖久則嘔吐酸水吐已停久復 生芝麻五钱用水二大東 一錢湯調服 验治準绳 十五枚煮熟 去皮核研 細

秦更九解 金にひたろす 治吞酸下可治自利 右細末煉蜜丸桐子大每服三十九米飲下 半夏麵多 方去茱萸加乾薑一两名温六九 乾薑 散品而歌兴茱萸 治濕熱帶氣者濕熱甚者用為向導上 枳殻 呉茱萸 橘 紅 甘草终半 **煮二** 遇雨 葛根 前胡 线各 Ł 白木

一人已可見一言 四 五苓散鬼消 區膿地黄湯塩 吐涎沫具菜更湯 鬼味 清水茯苓飲 水六升煮取一升八合分温三服如人行八九里進 茯苓 人參 生地黄焙川芎各 匵 治膿血嘔吐 白术兩一枳實一陳皮致生薑 證治準绳 夏製甘草哉半 南星湯 小青龍湯見 吱吱

金只四月有量 香砂寬中湯統 嘔蟲鳥梅丸 母服三錢半薑五片鳥梅 次芳藥 木香品服時 参各 半 及胃 白芷 四匙白术 寒 治氣滯胸痞噎塞或胃寒作痛 茯苓 卷二十四 檳 榔 一箇煎服 陳皮 11: 梗 夏她 香附 前 胡 鉞各 知 者 母

死己可臣 かき 補氣運脾湯 滋 燥結 水二 血潤腸湯 分甘草四分 厚朴錢二分甘草 一鍾薑三片煎八分入蜜一匙食前服 鍾薑一片聚一枚煎八分食遠服 孝 美白术美橘紅 治中氣不運噎塞 治血枯及死血在腸飲食不下大便 有痰加半夏麵一 證治準絕 茯苓錢半黄茂五致砂

金罗四座有量 冬利腸丸 水 胃壅滯推陳致新治腸氣之聖樂也 右為細末滴水為丸如桐子大每服三五十九食後 木香 枳實处炒黄大黄酒 大黃爛枳殼 鍾半煎七分入韭菜汁半酒盛食前 三錢方樂爆生地黃錢半紅花流桃仁酒洗了樂爆 鑑寶 檳 榔 麸炒 幾半人参 治胸中不利大便結煉痰嗽喘淌脾 錢 各 熟濕 厚朴当製各 當歸洗藿香 服 甘草 尖去

滋陰清腸飲 一陳湯見疾 諸飲 洪数者 沉透膈湯 水二鍾煎七分入童便竹瀝各半酒蓋食前服 當歸 生地黄谷 ち 楽 一甘草分 黄檗 班 黄連各十黄芩 治陰火上衝或胃火太盛食不入脉 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲 澄治準绳 來復丹見中 山梔

**新定匹庫全書** 五腸寬中散 食不進十腸五噎痞塞不通竝皆治之 服 每服肆錢水一盏薑三片棗一枚煎七分不拘時熱 神妙 草果卷二 白术一香附子以缩砂仁 朴豐產香 肉荳蔻 治七情四氣傷于脾胃以致陰陽 木香 陳皮各七甘草長一半夏湯洗 白荳蔻 人参西 青皮科 沉香 香 麥

大足口早亡与 谷神嘉禾散和 服 右為細末每服二錢薑三片鹽少許不拘時沸湯點 和胷腸痞淌停痰氣逆遂成五腸并治 進飲食或五噎五腸 砂仁 白荳蔻二两甘草两 木香两厚朴去皮薑汁缩 白茯苓生缩砂生薏苡仁 机把葉士气 丁香 治脾胃不和自膈痞悶氣逆生痰不 青皮由陳皮出的各附子+六两 發治準縄 一切冷氣

金グロルクで 服五噎入乾柿 抵當九 每服三錢水 青皮去穀縣 五味子料西 一去两芦 廸 黄 **銭炒** 半各 色大腹子以木香卷七甘草矣雨陳皮 丁香 ) 見畜 白术 = 霍香 五薑三片聚二枚煎七分不拘時 雨炒 枚腸氣吐逆入薤白三寸栗五枚 桑白皮 隨風子 炒 沉 檳 石 香 斛 榔 炒 酒 炒 白苴蔻 杜 和 仲 半夏 去皮 汁酒 神神 搗 皮炒 温 奎薑 和汁 去

芫花九事 大己日年在5 秦川剪紅九 蟲而效 用米飲送下 右為細京麵糊為丸如梧桐子大每服五十九食前 芫花脂炒 雄黄研木香錢 檳榔 乾漆炒烟度各一大黄 方良 牛膝 治腸氣成翻胃服此吐出瘀血及下 證治準絕 狼牙 根 · 一 两 三稜 選木 慣中去 半 桔梗炒藜蘆炒檳 <u>+</u> 柳

金厂口厂 七九食前 右為 患飲癖三十年暮年當多雜 飮 酒 樂治之要之須禁 則吐多睡 兩各 酒 紐 ATT THE 巴豆 末 多而食谷少積久漸瘦其病常欲思酒 酒 生薑湯一 即 酷 復不能食是胃中有蟲使然名為酒 炒十戶 止盖合此症也 糊 黑粒 為九如赤豆大每服二三九加至 酒 此 即易治不禁無益 方常服化痰消 因讀巢氏病源論 痰飲來潮遲即吐 堅殺蟲 Hr\_ 有 不 酒 瘕 瘕 時  $\mathcal{L}$ 

厚朴丸 天已日華 A 15 秋冬間下痢大效 後 右為細京入巴豆霜勻煉塞為劑旋旋九如桐子大 每服三九漸次加至五七九以利為度生薑湯下食 厚朴 茱萸 港菖蒲 而臥此藥治效與局方温白九同及治處暑以後 角 狂炙乾薑地人祭而一黃連二两 主番胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸 蜀椒故川鳥頭地去皮各紫苑去土具 **E** 春夏加黄連二兩秋冬再加厚 胡 證治準絕 古枯梗 茯苓 巴豆霜 官桂 兩半 疾

金厂口厂有量 萬病紫苑九見積 三乙承氣湯 朴二兩 蒲白茯苓為輔 為輔 肺之精加黄連人參為輔 蒲茯苓各一 更加人参菖蒲茯苓各一两半 秋冬久寫不止加黃連茯苓 如治風於春秋所加黃連厚朴外更加昌 一两半 如肝之積加柴胡蜀椒為輔 如治風痛不愈者依春秋加 益元散見傷 四 如脾之積加茱萸乾薑 如心之積 加菖 楽 如口

たとりらんから 煎七分去滓熱服不拘時候病重者每服一兩加畫 右㕮咀每服半两水盏半生薑五片棗二枚擘開回 味當歸不在試論之列不可即用然等分不多縱用 為下藥有泄有補卓有奇功劉河間又加甘草以為 三一承氣以甘和其中最得仲景之秋試論只論四 二片棗一枚若不納藥須時時呷服之以通為度雖 去皮炙當歸江 北大黄去羅芒硝 酒洗焙二 證治準絕 硝即\_焰 厚朴製枳實生用各甘草

四生九和升坊 對金飲子和 金万匹匠有量 右為末滴水為九梧桐子大每服二三十九白湯送角上成生光硝生用 电大黄香不可過存性一两黑牵牛亦一两 单北大黄玉麤皮酒洗紙色爆黑牵牛三两取頭 淨陳皮如馬為木四两人參而厚朴四两甘草或 治 切結熱常服肢體潤澤耐老 ø

大己日東心島 昆 参散見大 格拒方用對金飲子然初病作且於嘔吐胃熱類內 去海熱服先服承氣湯夜服四生丸如已效進食不 改咀每服半兩水盃半生薑 五片裹二枚同煎七分 布丸を 選用清利之樂審其虛實重輕方用前樂更住 黄芩皮心黑灰黄芪 噎 梸 治五噎咽喉妨塞食飲不下 強治準绳 厚朴九月及

金足巴尼台書 代抵當九見畜 噙化 右為細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服 昆 炒散 九不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大 射干的半柴胡 木通 百合两各一 鹹水麥門冬生 兩 川大黄州小科 一處羊角看右仁吳处炒黄紫蘇 芦陳皮湯沒獨椰 心天門冬生 郁李仁湯沒 ن 訶梨勒 **钱各** 半二 炒去 桂

竹皮散水 欠己日華在馬 呉茱萸九東 補中益氣湯見等 右㕮咀以水一斗煮竹皮下藥煮取三升分三服 茯苓 竹皮 竹葉 麻黄 治噎聲不出 方 草豆蔻仁各分 用 細辛 升 理脾胃胸膈不通調中順氣 桂心 融治準絕 通草 白殭蠶 生薑 6 钱橘皮 甘草的 麥 澤瀉 益智仁 五味子 Ŧ 薑黄

利賜九見及 金牙四座有量 滋野九見小便 黄芩加半夏生薑湯件 細嚼白湯送下無時 右為細末用湯浸蒸餅為九如菜豆大每服三十 半夏美大麥葉五鈴 柴胡各四當歸身 吐利 胃 消痞丸見 甘草泉各木香分青皮 黄芪補中 . Ø 痞 一湯君

黄本湯外 大足四軍亡馬 理中九見 水煮金花九 右水一 右水七升煮取三升温分三服 黄芩雨二 枚 黄芩西甘草 一斗黄取三升温服 古潔 午,两炙 治風痰 鞍治準絕 雨 桂枝 散即益元散見傷 升日再夜 夏半生薑四大 两半夏半大 暑 服

金岁四月分重 加减理中湯良 右為末滴水為丸桐子大每服百九先煎漿水沸 藥煮今浮為度源出生薑湯下食前 半夏洗天南星洗寒水石各一兩天麻料雄黄 參 白麵两四 鍾煎 霍亂 乾薑 鍾不拘時服若為寒濕氣所中者加附 白木錢一甘草銭 J.

次足四軍至書 中湯内加丁皮半夏谷 皮錢半名治中湯 少許頻服候吐出令透即進此樂 内去白术加熟附子名四順湯 中湯内加附子氏 橘 一錢名附子理中湯 红茯苓各一 若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方 名補中湯 若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯 さる中級 不喜飲食水殼不化者再加 生薑十片煎 若霍亂吐瀉者加橘 若源泄不已者於補 若傷寒結胸先加 若嘔吐者於治 Ī 若泄瀉者 紅青

金ダビガイニ 理中湯 府上築者皆氣動也去水加官桂 \* 發腎惡燥去水 桔梗枳殼等分不痛者及諸吐利後自症欲絕心自 欲飲水者加白术 恐作奔脉故加官桂 髙起急痛手不可近者加枳實白茯苓各 者去白术加附子 若霍亂後轉筋者理中湯内加火煅石膏 若渴者再於枳實理中湯內加括婁根 钱半 若飲酒過多及啖炙燒熱 若悸多者加茯苓気 岩寒者加氧薑鲜 名枳實 若腹淌 錢 若渴

香薷散 |飲定四庫全書 一香散 院分利陰陽安定血脉只用本方 發為鼻衂加川芎 水二鍾薑五片葱白三根煎至 藿香 大腹皮 蘇 方 桔梗 白术 1 治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴問亂 甘草多半 白芷 厚朴 錢 澄治準絕 香薷 若傷胃吐血以此藥能理中 陳皮 黄連 鍾不拘時服 茯苓 扁豆钱 半夏 紫

成吐利一 時吐利 陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變 效 右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不 两脚轉筋痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之 厚 此皆飽食多飲復睡冷席 朴 霍亂腹撮痛 百脉混亂禁衛俱虚冷搏筋轉皆宜服 皮 炒 曹黃連 大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出 各二两香薷四甘草 29 外 羽 内積結而不散陰 两半 此

桂苓白木散質 欠已可見公言 右為細末每服三錢白湯調下或新汲水薑湯下 此 亂吐寫轉筋急痛淌腹痛問小兒吐寫驚風皆宜服 可 石膏 葛根西半 桂枝 寒水石雨 人参 No. 治胃暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍 白术 證治準繩 滑石 白茯苓兩半澤寫 一方有木香藿香 辛四 亦

桂苓甘露飲 金万四月有重 熱嘔吐服之令人過身氣液宣平及治水腫泄 右為末每服三錢白湯冷水任調 湯見 滑石 肉桂 = 甘草 傷 两二 藿香 治老幼霍亂一服即效 鑑寶 澤瀉 流濕潤燥治痰涎止咳嗽調臟 蘇合香丸 人参兩半木香二錢白茯苓去白 萬根 見卒 石膏 除濕湯 寒水石為 濕 见 腑 中 利

大三日日十二十 氣湯四 許服之 右為細末每服二錢候發不可忍時用水煎入鹽少 揮霍變亂吐利交作 訶子 半夏海厚朴 良薑炒茯苓 檷 地去甘草 紅 核 治七氣鬱結五臟之間互相刑劫陰陽不 人参錢各 麥芽 白芍藥 厚朴製乾薑 證治準絕 炒陳皮各等 茯苓錢 桂心 血神妙 ÷ 草果去 紫蘇

金只巴匠有量 呉茱萸湯ほ 或乗舟車傷動胃氣令人上吐下寫併行頭旋眼暈 右作 手脚轉筋四肢逆冷用樂運慢須叟不能救 度霍亂吐寫其證始因飲冷或胃寒或忍飢或大怒 石同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸, 小枸時服 呉茱萸 服用水二鍾生薑七片紅棗一枚煎至 木瓜 治胃暑伏熱腹痛作寫或刷并飲水過 食鹽 半 入藥煎 鍾

建中加木瓜柴胡湯 文已日華 在· 平胃散鬼中 通脉四逆湯見泄 枯白礬為末每服一大錢沸湯調服更無前藥用塩 可服 至二升已下傾 撮醋 桂枝二两 杯同煎至八分温服或鹽梅醎酸等物皆 芍藥·甘草·膠錫非生薑 一盃冷熱隨病人服之卒無前藥用 五苓散見消 建中湯息傷 證治準絕 平胃散加木瓜亦可 瘅 四逆湯見 产 一十两大泉

四君子加薑附厚朴湯 四君子加白芍藥萬良薑湯 金只日月八十 同前法煎服 同前法煎服 每服一两水三蓋煎 四君子湯 **杜木瓜** 四君子湯西 柴胡 生薑 白芍藥 錢各 **盏半去查下膠陽两匙服** 附子 良薑 各五 鹽製 各

大三日年 建中加附子當歸湯 四 藿香正氣散 瓜湯植 順湯即理中湯倍加甘草 保 同前法煎 生畫 桂枝 飲見 食傷 而芍藥 一甘草 那陽升附子 一两 治吐瀉不已轉筋擾問 鳦 大東 中 證治準維 養正丹 來復丹 十補散即十全大補湯 魚見 見中 暑 當歸 =1

上渴湯 金女で月月 増損縮脾飲 右為細末毎服二錢不拘時塞湯調下 右到散每四錢薑五片紫蘇十葉空腹急煎服 澤寫 酸木瓜 参五麥門冬山茯苓皮桔梗 烏梅 甘草 鑑寶 兩茴香 五炙錢各 甘草 微二 炒錢 半具茶更 半两湯甘草 29 西 乾葛 瓜萋根 葛根 錢 ž.

麥門冬湯丸 欠足曰其心言 茯苓澤寫湯 時 每服四錢生薑三片同煎食前服一方有小麥五兩 每服五錢生薑五片同煎以水浸極冷旋旋服之無 麥門冬出白茯苓皮半夏为此橘皮 茯苓八澤寫四甘草泉桂心西二白木西 因 小麥 1 甘草是 遊治準絕 白术卷 **∓** 

金に正月 白术散於治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱 水二鍾生薑五片鳥梅少許同煎至一鍾不拘時 保養衰老及治酒積嘔哦 甚者加当汁續續飲之無時 右為細末每服二錢白湯調下如煩渴加滑石二两 甘草馬半 白术 茯苓皮人参 藿香品 葛根而木香 服

黄連九良 大足口事心的 右為末煉蜜和搗二三百杵九如桐子大每服二十 右為細末不拘時粥飲調下二錢 炙半 炒乾薑與木香大見地偷已上各可膠将碎炒黄 黃連去鬚策學學門十去皮生盛汁運矣今當歸 兩 錢各 鳥梅肉做黃連去鬚當歸做附子炮擊去熟艾 半門膠各線 肉豆蔻去赤石脂已上各十草 遊治準繩 六九

止血湯 金牙四月有重 赤 石脂湯食 右搗篩每服三錢水 當歸 啊 兩 赤石脂四升麻 不拘時粥飲送 陳原米城梔子仁 阿 方良 桂 膠 治霍亂下焦虚寒或便利後見血 煤炙 冷浦黄 治霍亂下焦熟結或利下膿血煩 ت 皮去 篇動 白术 一盏煎七分去滓温服日三服 甘草是西 当, 雨各 半 两各 生地黄蜡 乾乾薑名一 痛 四製

活命散 C.1.1 15 15 15 壅 石搗篩每服五錢水 右搗節每服三錢水一蓋半煎 朴硝各七大黄奶 厚朴 丁香粒菖蒲根再甘草 金炙令香 治脾元虚損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胸痰 治乾霍亂 汪古华经 盛半煎八分去海空心温 **麸炒高良** 生薑科鹽 一盏温服 檳 圭 **∕**à 柳 服

鉛方四月全書 冬葵子湯原 右判碎月童便一 右搗節每服五錢水二鍾煎 分 Ĺ 冬葵子 治脾胃虚寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不 厚 治乾霍亂大小便不通手足俱熱問 滑石研香需各二木瓜上收 朴蟹橘红 一盏半煎一盏分二次温 20 當歸 鍾温 乾薑地甘 服日四五 去 服 服 阁

大足り事人 参白木散を 每服二三錢用水煎 瓜煎 右用水煎服吐甚加生薑汁頻飲之 右用水水煎服 乾葛美 白术 吳茱萸湯地生薑 级半 木瓜木刀 茯苓 治吐瀉轉筋悶亂 治脾胃虚弱吐瀉作渴不食 人参 改治 準絕 甘草以木香 tη 霍香 £.

柏子仁湯 金テロレノー 多散 右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙 石末甘草湯調服 炎麝香为讲 參 關格 麝香 片腦 白茯苓 卷二十四 許 各 少 陳皮 栢子仁 甘草

既 檳 次定四車全書 木通二陳湯爾 濟九編會 右末糊九如桐子大麝香為衣每服七九燈心湯 右生薑煎服 柳益氣湯會 熟附子 麻 檳榔則人參 甘草 **浸童** 治關格脈沈細手足厥冷者 柴胡 治關格勞後氣虛不運者 治心脾疼後小便不通皆是痰隔 参数者 白术 從治準鄉 枳殼 當歸 黄芪 陳皮 圭

導氣清利湯 編 痰丸 右生薑煎服服後探吐更不通加味小胃丹加味控 中焦氣滯于下焦 半夏薑白茯苓 木通 猪苓 檳榔 澤瀉 陳皮去白茯苓 黑牽牛 治關格吐逆大小便不通 白术 陳皮 半夏董甘草 甘草 大黄 藿香 **水通** 相子仁 积殼 梔子 許少

早角散會 大足日草 红雪 加味麻仁九年 石為未蜜九熟水下 如又不通用蜜導 右生薑煎服無服木香和中丸吐不止灸氣海天樞 大早角性存 杳 大黄一白芍樂 檳榔 治大小便關格不通經三五日者 治關格大小便不通 积殼各五麝香少 厚朴並汁當歸 避治準縄 杏仁 圭 南

金八旦馬 大承氣湯 補陰九溪 根 右為末米湯調下又以猪脂 食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心草茶 黄檗 洗洗 呃逆 潮見無寒 **乾者上**擅 用酒炒酒 褐拌 降陰火益腎水 色新 知母去皮 兩煮熟以汁及脂 四酒 两拌 濕 熟地黄牌 大慶

理中湯見電 九三四草 红 橘皮竹如湯 為末水丸隨證用樂送下太補九冊 治腎經火燥下生 右細末猪脊髓加煉蜜為丸如桐子大每服五十丸 空心畫鹽湯下 敗龜板縣多黄 治腎經火燥下焦濕 政治準經

李疾湯並見太便二陳湯本香和中九見大便二陳湯 桃仁承海 調胃承氣湯烈發 桃仁承氣湯見富以水一斗煮取三什温服一什日五服以水一斗煮取三什温服一什日五服 中皮 计 大聚三十生 盖片甘草西人外 陳皮湯

欠正日日 1.1上旬 柿錢散潔 香柿蒂散蜜 時 右為麤末每服三錢水一盞半煎七分去查温服無 右為細末水煎食後服 以水七升煮取三升温服一升下咽即愈 丁香 柿蒂 柿錢 人参各等 青皮 推治準縄 陳皮名等 İ

羌活附子湯寶 金江四月至書 小半夏茯苓湯見恒 香調魚散見中 滓熱服 右為細末每服二錢水一盡半鹽一撮煎二十沸和 看散婦人治心吃噫 羌活 丁香 白豆蔻各半伏龍肝 附子地木香 枳實半夏湯見傷 丁香煮散見不 尚香好谷乾薑雨

羌活散同 麥附湯同 たこう国人芸 右蓋棗水煎徐徐服去人参加黄茂名送附湯 自利或臍腹疼痛呃逆不食或汗多發痙等症 右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎服 右為末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下 人参两附子绝五 治陽氣虚寒自汗惡寒或手足逆冷大便 治呃逆 附子炮茴香料兩木香 證治準繩 圭

枳殼散本 動玩四周有書 丹溪治宣州人與前方證皆除氣上築心腸噫氣稍意 旅覆代格湯見傷 右為細木每服二錢米飲調下日三服不拘時候 脈之右關弱短左關左尺長洪大而數此肝有熱 瀉肝補牌 枳殼 白木各半香附而檳榔 治心下蓄積病悶或作痛多噫敗卵氣

· 電氣胃中有火有痰 大足四軍 ALES 調中益氣湯見勞 熨下保和九十五粒抑青九二十 粒 各等分水煎服 南星製半夏 諸逆衝上 治疾氣壅塞上盛下虚心火炎盛腎水枯 軟石膏 強治準繩 蘇子降氣湯見諸 香附

金げて 竭 右用黑盞或新鐵銀內如常法結黑錫硫黄砂子地 擦合光瑩每四十九空心鹽薑湯或東湯下女人 研至黑光色為度酒糊丸如梧子大陰乾入布袋內 上出火毒研令極細餘樂並細末和勻自朝至落以 沉香 肉桂平破故紙 金鈴子茶去皮核 應下虚之證及婦人血海久冷無子赤白帶 117 葫蘆巴酒浸 硫黄 船笛香炮肉豆蔻麵 附子地陽起石 黑錫去津秤 細水 一两 爬

**華澄** 聖砂丹見區


南天竺飲聖 四种湯元 多庆四月全書 水一大碗煎至半碗去查不拘時温服水一大碗煎至半碗去查不拘時温服料去燈心如小神大聚去核甘草瓜半南天竺草生里零是如拇生薑一塊如山梔子上南天竺飲聖 治血妄行九竅皆出服藥不止者 右為細末酒詢服三錢 諸見血證 川芎 赤芍藥和一乾 治婦人血氣心腹痛不可忍者 花薑鬼半

生血地黄百花丸良水煎二三服立愈 茜根湯香 十全大補湯見虚 九足口巨人生 辟内痔虚勞寒熱肌肉枯瘦 生地黄祖+ 四物湯加童便浸香附一致苦草根二錢 治吐血咯血嘔血等症 计生 酱米斤親四兩白沙蜜四無灰酒 設治率絕 治諸虚不足下血咯血奶血肠 半

金グロ屋とうで 巴上五味用銀器或砂鍋内熬 至二校許斯成膏 次入後藥 半磁器收之一半八乾山樂末三兩再發一二十 右為細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每服五 丸用温潤調地黄膏子送下空心食前進三服 黄茂蜜石斛去根覆盆子 當歸焙熟地黄焙肉從蓉酒浸破故紙 茯苓去枸杞子口雨 19 遠志法麥門冬去白 阿膠 沸

必勝散元 生地黄飲子浪 九七日軍在島 身京惡風加桂幾吐血者多有此證 右對碎每服 炒 黄浅 生地黄 烏梅肉 芍藥 當歸 治男女血妄行吐血嘔血咯血奶 熟地黄 兩水二盤煎七分食後温服如脈 治諸吐如下血弱血 熟地黄 證治準繩 枸杞子 甘草谷等 并根川 地骨皮 用 如 血 当 早 血 浦黄 門冬 微

金ラセルノニ 皮湯式元 右吹咀用醇酒三升漬之一 贏瘦不能食心松少氣 燥渴發熱 右等分廳末水煎去浑温服無時 熟地黄水酒煎飲清 生地黄 炊時久漬汁半升服食後時對病增損 治血 甘草 如吐血嘔血皆失血虚損形氣不 治主脈浮客脈扎浮扎相合血積胸 黄檗 | 宿以銅器盛米飲 白芍樂 兩名 肘 後 理 用 ....



理中湯見霍 對好四庫全書 熟地黄送生地黄三當歸一黄補血湯車 右為細木食後黄茂湯調服二錢 右麤末每服半兩水二蓋煎五沸去查温服食前兩 阿膠各三 川芎二牡丹皮 鐵赤茯苓 白芍藥 卷二十四 升麻 小建中湯男傷 送各一錢半一 川當歸 生地黄 者 上補 竭

文色日巨 /... 盛 角地黄湯活 滿自言滿者無熱也不用黄芩 主治不同以升麻代之以是知引入陽也治瘡疹 右㕮咀水煎服 如血吐血犀角地黄汤主之 ,脈乳兩頭則有中間全無而虚曰乳血在胸中 犀角如無以升 为樂 生地黄 如元虚人以黄芩芍藥汤主之 易老云此樂為最勝 熱多者加黄芩 **丌麻與犀角性味** 牡丹皮 黄芩芍藥湯 脈大來遲腹不 黄芩芍藥甘 用

強治準繩

与附飲三 家不能飲食如血吐血 字散生濟 物湯見虚 右為細末每服一字薑汁茶芽煎湯不拘時調服 右為細末每服二錢不拘時茶湯調服 川芎二香附 細辛再半川烏突生五 兩四 血產十四

黄芪芍藥湯東 者湯 佐之即愈此脱血傷精氣之證也六脈俱大按之空 血也此大寒證以辛温補血養血以甘温滑潤之劑 八脈細弦而濇按之空虚其色必白而天不澤者脱 右為麤末每服半兩水二蓋煎至一盡去查温服 樂賤 黄茂一甘草炙二升麻而葛根 羌活各半白芍 五苓散見消 治鼻如血面多黄眼湿多眩手麻木 金沸草散則

欠至日夏 ALL

世治準繩

茯苓補心湯三 威多而亡 血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮氣 虚心動面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此因氣 以辛温微苦峻補其血再用三黄補血湯 薑五片東一枚水二鍾煎一鍾食這温服 七分 枳殼麸炒桔梗去甘草 陳皮玉白各 香五紫蘇葉 乾葛 白芍藥 川芎 黎半夏 當歸錢 前胡去茯苓

小鳥沉湯和 調 たこうられ 每服四錢薑三片水煎服 雞蘇葉 麥門冬法桔梗 入鼻中乃肺金受相火所制然也 十兩甘草两一 黄送去生地黄 W. 調中快氣治心腹刺痛 治鼻如血者初出多不能止用黄丹 浦黄炒貝母去甘草及各 強治準繩 香附子少強內 阿膠 白茅根 淅 去 兩

煎調服 右為細末每服二 右為細末每服 地甘草 降氣湯見諸 黑豆 治奶血往來久不愈 |錢酒半盞童子小便半 錢不拘時沸湯點服 蒲黄各四 黄潭歸 湯見屋 損

大王日**自上** 找鹽丸 ·商治舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此 心臟病 香散見心 右等分焙乾為細末每服二 戎鹽 生地黄 甘草 血衂 熟地黄 避治準繩 大黄春五人 枸杞子 雪 桂

香麥丸 右為細末煉蜜和九如梧桐子 右為細末煉蜜和九如小彈 下一日三四服 下日三服亦焼鐵烙之 治心臟熱甚舌上 治心臟有熟舌 生浦黄 半二人 麥門冬法當歸 一出血 出血如湧泉 子大每服一丸温水

KIND IN LINE 金散 右研写每服 母服三錢七水一 合更煎|二沸温服 研 治心經煩熱血妄行舌上出血不止 治心經蘊熱舌上血出及諸失血 黄三錢新白麵三錢牛黄 龍腦研各 小薊根 錢生藕汁調服食後 / 盞煎至七分去浑入生地黄汁 推治準輝 艾葉七幾 寒水石三

紫霜丸 治舌上出血如簪孔方 右為細末煉蛋和丸如櫻桃大每服一九水一紫金砂貨處是研一兩 蘆薈碗 貝母出於 化開煎至五分温服吐血動血用温酒化開服 每服三錢七水一盞煎七分去浑不拘時溫服 紫金砂貴處是研一兩 合同炒 治舌上出血竅如針孔 松黄 相葉炙各 とこり言いい 每服二錢七温米飲調下黃檗人為焦研為末 右以酒二升漬一宿煮三沸去滓頓服 右為細末每服一錢七食後新汲水調下日二服 黄樂子兩青黛五分 齒衂 治舌上出血不止 治舌出血不止名曰舌衂 超治準網

清胃散 黄連散 多穴四周至書 雄黃麝香散寺政治牙斷腫爛出血 石為細末研匀每用些少傳患處 錢」 雄黄 黄連 見頭 治齒斷間出血學食不得 残麝香り銅緑 白龍骨 白礬枯谷 甘露飲見 安腎丸鬼咳 馬牙硝各一白礬 輕粉 黑錫丹見路 黄連 龍腦 黄丹 遊

生肌桃花散 治牙斷內血出或有竅時出血 とこりらんにか 鬱金散 治齒出血 傅亦可 右為細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含鹽 右為細末研与每用少許貼患處 右為細末每用少許傅牙根下 鬱金 白芷 細辛分等 寒水石幾三硃砂縣一甘草炒一片腦 改治準 輝 咒

神效散 治牙宣出血 治滿口齒血出 右入瓦器內燒灰存性每用一字指齒立效 右研細輕手擦良人鹽湯灌軟 右用枸杞為末煎湯嗽之然後吞下立止根亦可 草鳥 青鹽 卓炭谷等 明白蓉城二九香埃麝香少 治牙縫血出

柴胡清肝散薛 大元日日 ALLE 治齒縫中血出 治齒縫忽然血出不止方 右用梧桐淚研為細末乾貼齒縫如血不止再貼 方用子汁含滿口後更食 發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳 右以紙絍子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止 耳衂 治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒 設治準編 四九

六味地黄丸見虚 金人也是有一 麝香佛手散於 右水煎服 右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡 ·腹下或兩股内側至足等證 柴胡 麝香少人牙烟過存性 桔梗谷四甘草二 黄芩炒人参谷三山梔炒川芎谷五連 治五般耳出血水者 卷二十四

· 自歸身谷一甘草久 蘇子降氣湯 吐血 ·樂散治熱壅生風耳內痛與頭相連血水流出見 現而屬者酒調一字服之即出 参去鐵五味子和 黄茂去麥門冬去白芍藥 吐血 治脾胃虚弱氣促氣虚精神短少如血 拉治準繩 養正丹俱見 至

團参丸時 石膏散奇 右作 茅根湯下食達服 右為細末滴水和丸如梧桐子大每服三五十九用 青行站 石膏 服水二鍾煎至一鍾食遠服 麥門冬雨 黄芪 治吐血咳嗽服凉藥不得者 葛根 飛羅麵各一百合鱼 生地黄

KINDIEL MILLS 冬去心煎湯下不拘時服又治肺損吐血日漸乏力 右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼麥門片腦幾川芎 桔梗 生地黄 甘草西 行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀 每三錢水一 雞蘇葉八黄茂 見傷 治虚熱昏冒倦怠下虚上壅嗽血如血 中蓋煎六分去浑不拘時温服 防風去荆芥各一 遊治學運 五苓散見消 一药花三

龍點難蘇九和 多分四月百十 石為細末以蜜二斤先煉一二沸然後下生地黄末 崩下血血林凉上 加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下 膏 雞蘇淨葉監簿荷 柴胡二兩對同本通 浦黄 斤即龍甘草 治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻動血 一膈虛勞 煩熱 參格二麥門冬四两黄茂 计後入青 大通二两到以沸湯大半大通二两到 雨生乾地黄末六雨 同

黑神散 大王日日 在時 四友九萬 令焦然後将其餘樂末同和為丸如豌豆大每服 不住手攪時時 心藕節 冬去遠志去心甘黄 治思慮傷心吐血衂血 阿膠 草煮 改治準繩 蘇合香丸 小鳥沉湯俱見 丸 見 中 춫

松花散奇 右為細末每服二錢不拘時米飲調下 水二鍾生薑五片煎至一種不拘時服 刺薊 越齿草根 治吐血久不止 甘草炙赤各 兩生地黄 治吐血不止咳嗽補肺 一多一錢各 白茯苓 各二十四 鹿角眼 紫苑苗 兩 上各 百合

大三日耳·金哥 阿膠丸 酒亦可 煎後入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調 右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐徐著火美 清酒母新 糊生薑汁 本為杏仁 生地黄汁 如湯浸沸方下水 治肺虚容熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有 投治準繩 兩同入煎中 下後樂 黄明膠系素充 味同酒入黄明膠系標素充 味同酒入黄明膠系標素充 黄牛乳半 升 胡桃

和浑服 石為細末審九彈子大每一九用水一盤煎至六 鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血 麥門冬去丹麥 百部根 熟地黄 炒卷相 製杜仲西半速志肉 治嗽血唾血 阿陽炒茯苓各一次神 生地黄 具母以防風而半山樂 卷二十四 人参各二

杏仁去皮尖甘草炙桔梗炒各 疽 右為細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬湯 九食後 速志 雞蘇葉 根洗犀角等升麻 治食啖辛熱傷於肺經嘔吐出血名曰肺 麥門冬 防風各半乾山 桑白皮去皮滿黄炒 百部

四生丸 工中湯見霍 右搗爛為丸如雞子大每服一 生荷葉 |錢生薑五片煎至||鍾不拘時服 治吐衂血熱妄行 血 十全大補湯見產 生艾葉 側相葉 九用水二鍾煎 茯苓補心湯則

補 てとりこ しここ 日 肺湯 血腥臭喘乏不凡 右為麤末每服三錢水二盞薑五片大棗一枚粳米 一十餘粒煎一盛食後温服 人参片五味子揀款冬花梗肉桂去 嚴紫苑鍾乳碎如桑白皮 麥門冬二兩 白石英 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯睡 金型電砂丹見唱

百花膏濟 三炒丹和 時鹽湯下 右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服六十丸不拘 葫蘆巴除去同炒之 樂已上各一兩 吳茱萸故紙一兩同炒俱佳香熟 石為末煉蜜丸如龍眼大每服一丸臨即嚼姜湯 款冬花 百合案后各 卷二十四

五味子黄茂散蟹 てこりま だいい 八阿勝九見吐 湯歸 下煎 石為末每服二錢茶湯下麻草云黃藥子白藥子 血竭發 索角半鱗 治勞嗽吐血痰 金二錢當歸非山樂 治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢困 強治準繩 多知母 乳香 柔 没藥 胡

黄茂鱉甲散蟹 右為贏木每服四錢水一種半煎七分日三服 肠不利食減多渴咳嗽稠粘時有膿 心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晚潮熱夜有盜汗 倦脚膝無力 黄芪 麥門冬 白芍樂 五味子為二人多錢 治虚勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五 桑白皮 熟地黄 桔梗而 甘草 血 胸

たこりま 心煩熱咽乾頰赤心中潮熱盗汗減食吃 柴胡 **於數數數** WILL OF THE 樂 麻 表 天門 桔梗 地骨 次孫桑白皮各一 治虚勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠 大錢水 六錢肉桂 超治準 槌 心焙 兩 **鳖甲去被茯苓各二** 大盛食後煎服 柴胡奇 久嗽 膿血 柔

滋陰保肺湯 金グロアノニア 石水煎服 机把葉去毛具當歸 芍藥性黄檗性水和母各七零門冬去 右為贏未每服五錢水煎服 甘草五分 一錢五味? 黄笔三两 松石桶紅 卷二十四 紫苑谷七桑白皮 祭人生地黄 三幾天門冬 阿膠

右為細末磁器內盛每日如茶點服神效 血消面生瘡遍身黄腫 兩 麥門冬山桑白皮 我三人參 茯苓 具母 知母 桑白·飲魚水洗去腥氣酥炎黄色 杏仁炒五 治二三年間肺魚上喘咳嗽咯睡 班治準運 生地黄香一

雞蘇丸見吐 参救肺散時 破同煎去查食後温服右為魔木每服五錢水二盏生薑二錢半聚三枚劈 牛炙 兩合 桔梗 人炒淡竹站 白芍樂 治咳吐血 當歸尾 熟地黄络 麻黄去根節各丘味子 柴胡錢各 倒着法見積 桑白皮 甘

杏子湯鬼 甘枯湯県咽 **赵己可臣在自司** 白扁豆散事 水三升煎一升去浑下檳榔末一錢和勺分作四服水三升煎一升根七錢中白茅根七錢白扁豆 生薑各半批把葉玉半夏 人參 白 不拘時候 水二鍾煎至一鍾食遠服 護治準 繩

温服日三 冷飲食減少 漫地杏仁 **淡嗽痰中有紅線盜汗** 阿廖少马

九已日巨 白馬 右為末煉蜜丸桐子大空心白湯吞下八九十 服治陰虛火動咳血等症甚效 石為細末入白硼砂少許煉蜜少加薑汁為九無 海粉 懷地黄 九溪州 杞子 九白湯下 此北水之主以制陽光劑也與前方相 牡丹皮 **遊治準郷** 麥門冬 訶子肉 黄相童便沒知母 馬兜鈴

四物湯見虚 地黄自然汁調之火上頓化入前件為丸如龍眼 石為細末另以阿膠五錢割如豆大蛤 粉炒成珠 母服一九%化 咯血 七珍散見飲 黑神散

次至四重全書 · 阿膠牌 內房館 糊啜服 右為極細末入藕節汁磨京墨令黑調藥一 白发 溲血 養金色例拍葉 超治準 輝 甘草人兩當歸 四物湯見虚 華敬炒各

鹿茸丸齊 川牛膝去蘆鹿其去毛五味子為石川忠縣外東為一沉香半兩各一沉香半兩各一沉香半兩各一沉香半兩各一沉香半兩各一沉香半兩 右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心温酒 每服三錢水一盞酒六分煎八分空心稍熱服白芍樂 熟乾地黄春四

辰砂妙香散見 玉角膏三 味地黄丸兒虚 九鹽湯下 右為末用茅根汁打麵糊為丸如桐子大每服五鹿角膠再沒藥研油頭髮灰錢三 治尿血并五林砂石疼痛不可忍受者 治房室勞傷小便尿血 Ų 遊冶準繩 調胃承氣湯見發 奎

多方四库生 小煎飲子生 治下焦結熱尿血成粉熟蘸黄茂人參末吃不以時仍以鹽湯送下 少時熊蜜炙乾複熊復炙盡蜜二兩為度勿令焦至 右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹 右吹叫每服四錢水一盏煎八分空心温服 生地黄的小煎根 滑石 通草 浦黄炒藕節 以人参各等 卷二十四 當歸去在上她仁 甘草果兩

欠足习事上生了 治血淋方 分作三貼水煎食前服 當歸 和黄柏 務糊丸如梧桐子大每空心白湯吞下 山栀仁格一生地黄 治婦人 羚羊角 八小便出血或時尿血 知母 避治準繩 澤寫兩各一 麥門冬 쳧

叉方 又方 東少豆屋 白電 右水煎服 牡丹皮 甘草稍 人参 白术 川當師 滑石 當歸 白茯苓 卷二十四 生地黄 山梔子 熟地黄 澤鴻 川芎 山查 白芍薬

とこり直 とこう 一頭 服 右為細末每服二錢入血餘燒灰一錢食前沸湯 瞿麥穗 黄苓 甘草炙各 下同治血淋尿血 治血林 桑白皮炒石章 錢加生薑皮二 赤芍藥 避治準繩 車前子 五生乾地黄 一分燈心一 阿膠炒滑石 子四 用無花根 謜

當歸湯 儑羊角飲 右各等分到碎煎湯作熟水思此疾者多渴隨意飲 右用乾柿蒂焼灰存性為末每服二錢空心米飲 當歸盖淡竹葉 冬出烏梅 木龍海勒縣甘草 治血淋及五林等疾 治血林小便結 燈心 竹園姿 卷二十 四 紅棗 je

雞蘇飲子 とこりえ ニア 服 右先将四味以水五升煮取二升去降下葵子去 石捣箭母服三錢七水一 藍花炒麥門冬之大青 儒羊 角盾 為末 握石膏八分竹葉 治血淋不絶 發治準繩 一盞煎七分去浑不拘時温 一姓地黄 Ì

金黄散 温 效方 右為細末每服 右為細末每服一錢七燈心煎湯調三日 海螵蛸 一服如人 治血林 治小便血林疼痛 冶血林岩單 八行五里久進 生乾地黄 一錢用柏葉車前子煎湯 小便出血如尿 赤茯苓各等 服忌無美蒜麵炙肉


治尿血方 次之司·直 11.5 国 次公司 四苓散 調下 右以水二碗煎八分去滓調四苓散空心服 右用亂髮焼灰入麝香少許每服 天門冬士地榆 淡竹葉 麥門冬 白茅花 車前子 香附子 鬱金 燈心絡半 投治學師 澤寫各等 錢用米醋温湯 , 陳柳枝 į

牡蠣散 浦黄丸 金与四月多書 右為細末每服二錢空心用前藥調服 右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服 三十九食前用米飲送下 消黄 杜赐版為車前子 當歸放荆實也上各奏門冬去生地黃兩 治虚損膀胱有熱尿血不止 治勞損傷中尿血 獒子 赤茯苓 黄茂心肝各車前子 白龍情 烟令

如神散 鹿茸散 右為細末每服二錢食前米飲調下 石細末每服半錢或一錢井花水調服日三 阿膠的粉炒山梔仁 車前子 桂心两各 治心臟有熱熱垂於血血渗小腸故尿血 治小便尿血日夜不止 黄芩 甘草

治小便頻數卒然下血不止並不疼痛此緣心中積惡 方治下元虚憊尿血煉蜜為丸如梧桐子大每服 色傷小腸氣虛血垂虚妄行故有此疾宜服此方 機謀艱險長懷嫉妬多積忿氣傷損肝心正氣又因 右為極細末每服三錢七空心用温 冬葵子炒四 九食前用炒鹽湯下 雨熟地黄 茯苓各半人参 酒調服日二 当 獨

欠已日至 九十二 犀角地黄湯 丑夏當苦淋漓之疾出血不已得黄應明授此方而 妄行衂血等疾食後臨卟服之用絲茅根煎服余癸 非時與服此樂後其血已安校覺丹田元氣之虛腰 錢非時點服補之 膝沉重多困少力者宜用桑寄生為細末每服 右為細末每服三錢七水一盏煎一二沸便寫出去淳 浦黄多二甘松 治小腸淋瀝出血疼痛難忍及治心血 **強治準繩** 沈香四名 厘 交



黄連湯潔 たこりる とに 樂黃連湯常 母服五錢水煎 芍藥 黄連 錢電中黃土 甘草 升煮取三升分温二服 黄連 當歸 熟地黄 升半 錢五甘草矣二 當歸而 大黄 幾淡桂五甘草 白术 班治準編 附子 阿膠

金云四月白書 和中益胃湯東 升麻補胃湯東 右作二服水二盃煎一盃去查稍熟食前服 每服五錢水煎痛甚者調木香檳榔末 錢 錢萬根 升麻 白芍藥 牡丹皮 柴胡 當歸身各三肉桂少 防風餐半黄芪 卷二十四 熟地黄 生地黄 羌活錢 餃 甘草炙 獨活

欽定四車全書 水四大盛煎至一盡稍熱空心服 陽除濕和血湯東 水三大盃煎至一盃去查午飯前服 秦光 肉桂分三陳皮 生地黄 牡丹及 炙甘草 生甘草各五白芍 甘草外三益智三 中 黄茂 致升麻分熟地黄 當歸身三分升麻五柴胡五蘇木 在治 準 當歸身 養术

七味白木散見消 益胃和中 右為廳末水三盏煎一盏去查食後温服 陽除濕防風湯東 桂枝四肉桂一丸薑少 白芍藥 净炒四錢白木 分當歸身 黄茂 柴胡 葛根 益智仁 炙甘草

結陰丹質 胃去濕脈實復脹閉塞不通宜從權以苦多甘少 煎至一大蓋去查稍熱空心食前服如發泄不禁以 泄之如得通復以升陽湯助其陽或不便以升陽湯 右除蒼术另作片水一碗半煮至二大盃內諸樂同 中加泄藥通之 **此樂等其濕如飱泄及泄不止以風樂升陽蒼术益** 風 治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

到定四库全書 平胃地榆湯質 醋少許煎過放温送下 右為末酒糊丸如桐子大每服五十七丸陳米飲 首鳥 蒼 殺麩威靈山 茯苓 厚朴 荆芥穗谷半 白芍樂 升麻 乾薑 黑附子炮各地榆七白术 两 益智 黄芪 卷二十四 葛根後半甘草冬當歸 陳皮去椿根白皮 陳 何

たこうえ 胃風湯 痰加半夏 水二盡生薑三片聚二枚煎至一盡去查食前温服 熱空心服小兒量力增減 每服二錢水一大盏栗米百餘粒同煎七分去杏 分為十味名十補湯 术各等 简 7.1.L. 茯苓 ध् 若發熱加柴胡 川芎 避治準繩 岩虚勞嗽加五味子 官桂 若加熟地黄茂甘草 岩有汗加牡蠣 當歸 **芍藥** 岩有

多片四样全書 浦散 氣弱加人參 川芎 虚寒加附子 骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩 加白芍藥 黄連 炒起角 岩惡風加官桂 浦黄炒各 若胃熱濕盛加白术 ち 楽 若小 便不利加茯苓 若寒甚加乾薑皆依本方等分 川芎各 黄芩 若脈澀加當歸 當歸 甘草 岩脈弦澀 生地黄 岩腹痛 加

香連丸見滞 黑神散見身 枳殼散和 駐車丸 理物湯即理中湯四物湯併用 次户日屋 ALS 加蒼术白术 見 · 鍾煎八分食前服 見滞 淖 消 吳茱萸九鬼屬 神應九見傷 四物湯見虚 文湯 为 涉 發治準繩 酒毒加青皮乾葛 理中湯見霍 平胃散兒中 黃連 阿膠九月 7見泄 キ 濕毒 滯

烏連湯三 **酒煮黄連九**易傷 右為末每服一錢空心沸湯點服 烏頭 每服三錢水 **积殿去粮炒** 鳥頭鄉各 **五煎五分空心温服熟加黄連冷** 烏梅九見寒 甘草 烟六 小鳥沉湯與 鼻

烏荆丸和 恭連九濟 たこうる ここ 川鳥縣一兩荆芥穗二病風樂播頭額寬雜不收六七服應 痒並婦人血風頭疾眼軍及肠風藏毒下血不止有 服四十九空心陳米飲送下 右先用獨頭無限香熟和樂杵写九如梧桐子大每 獨頭蒜 治諸風縱緩言語零溫遍身麻痛皮膚 馅 黄連去鬚不拘 京子

右每服二錢空心好酒或清米飲調服 收採不拘多少燒灰 粮灰散潮 一灰散杨 有疾食空時日進三四服無疾早晨一服 右為末醋糊凡如梧桐子大每服二十九酒湯任 作白灰 乾 側柏略好為相子灰再烧作灰棕櫚焼存性 化為

敗毒散見傷 槐花湯 斷紅九齊 欠正り巨 水二鍾煎八分空心温 右分作二服空心糯米飲調下 視花 炒側柏葉 料 料 芥想 侧 占統 林子黄茂去當歸去益粉外 川續斷酒鹿革 服 一兩 白礬 枳 **敖** 是 数 数 数 **基兩枯皮炮** 半臍去 五黄分色 阿 各 膠

附方 金月口工 痔下血不止芎歸丸 右為細末陳蜜為丸如梧桐子大每服五十九食前 全大補湯見虚 右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服七十九空心 米飲送下 兩荆芥穗 川芎 當歸 頭髮燒存木賊 神妙想花妙黄茂 黄、飲即黄、六 卷二十四 阿膠一兩 一湯月自

TEST TOTAL STATE 黑丸子 加味四君子湯 弱氣乏口淡食不知味 九空心用米飲湯送下 右為細末研勻醋糊為丸如梧桐子大每服三五 用米飲送下 葉 亂髮巴上各一兩二錢半桂心髮白芷五百草霜 白薑兩一木饅頭三鳥梅 敗機 專治久年痔漏下血 治五痔下血面色萎黄心松耳鳴 验治準繩 李 柏

臭樗皮散良 金少也左右軍 軰 右為細末每服二錢白湯點服一方有五味子無 石為細末每服二錢食前粥飲調下 而少葉三分具樗皮做酸石榴皮 分 白术 治痔漏下血及濃不止 茯苓 白扁豆 燕黄芪 黄連是地榆 阿膠

火足切員 白 地 榆散方 服 右用地榆為細末每服二錢七食前米飲調下日 空心米飲下 冷取出研如粉以麵糊為丸如梧桐子大每服十 右捣碎入磁確子內用炭火五七斤燒炭盡為度 白礬兩緑礬三黄丹 治血痔 治痔疾下血日夜不止 S) 發治準繩 伏龍肝 丰

止血方 治血箭痔 金少正屋台書 治痔疾便血方 右用苦楝子肉為細末潤煮糊為凡如梧桐子大每 服三十九空心蒼耳子煎湯送下日三服 用梭皮二兩洗淨寸截先将梭一兩銷在瓦確子内 右用明血竭為未傳之 右用活腳魚 治痔瘡血出不止 **箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去** 卷ニナ N)

猪臟九 とこうこ しこ 取樂細研每服一錢食前用米飲調下忌動風之物 地以瓦盆合定淨土擁勿今透氣經一宿出火毒開 子四面用熟炭火六七斤燒煅侯煙絕取確子於淨 火畔灵乾量確子開一地坑先安小磚一片後坐確 次安魚上面却將檢一兩益之即閉確口黃泥固濟 痛裹不怠先用海螵蛸炙黄去皮白者為末以木賊 草煎汤調下三日後效 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不 验治學絕 李

到好四庫全書 槐角散 猪臓丸 右吹咀每服五錢水 右以黄連塞滿猪臟紮兩頭煮十分爛研細添糕 如梧桐子大每服三五十九食前米飲送下 **槐角四枳殼** 梅 划碎嫩猪臓 治脾胃不調脹滿下血 治痔瘻下血 甘草各半 當歸 蓋煎七分去草食前服 肥 蒼术 陳皮 厚朴 製 糊 兩各

腳魚方 欠色日草上 黄 熨斗内烧带生存性為細未每服一錢空心温米飲 右用敗機皮重包外用厚紙裹先煨令看熟去紙 右捣和丸如梧桐子大每服五十九食前當歸酒送 猪臓 大活即魚一是不去鱗肚下穿白禁一塊如 净一控係 治肠風血痔及下痢濃血積年鴻血面色萎 乾棍花繁定石器内 姓治學絕 米 臓 醋内煮两 爛頭

勝 金少豆匠 U 金丸 調 飲下一 桐子大每服二十九食前粥飲 季側柏散 血 右為細末軟飯和丸如桐子大每服五十九空心米 百藥煎炒三 樂 方瓦瓶内益定炭火烧為灰軟飯和丸如 散名 方為細末米湯調二錢服 百 治腸風臟毒下血不止 焦雨 治 腸 兩兩 風下 焼生 存用 血弱血不止及臓毒或便 性 兩 梧

たこり目という 風黑散 **炙木饅頭為末每服二錢食前温酒調服水煎亦** 右同入磁瓶内泥固濟燒存三分性出火氣同枳殼 **灵為末每服二錢食前枳殼湯調下** 右為細末每服二錢糯米飲調下一方用葉一斤洗 甘草炙各 側柏葉焼 荆芥烧枳殼炒各乳髮 治臓毒下血 秋採西冬採北存性春採東夏採 超治準繩 冬採北 槐花 槐角 子 蝟皮

椿皮丸 右為細末每服二錢不拘時米湯調下 用米湯送下 右為細末醋糊和九如梧桐子大每服七十九空心 甘草炙三 東行椿根白皮 黄連 治痔漏下血疼痛 治腸風下血疼痛不止 贯架 雞冠花 卷二十四 烏梅肉·大黄系

卷柏丸 していりる ハエト 東 治腸風臓毒方 右為細末每服二錢空心米飲調 角地黄湯見鼻 右為細末每服二錢空心米飲調服卷柏生石上萬四五寸根黄如絲黄花谷等 上裏果斯 畜血 治臓毒 桃仁承氣湯 **滕治準**媚 抵當湯其鬼傷

多分四母全書 抵當九與湯四味同但分兩減半捣細水調服前之百 許州陳大夫傳仲景百勞九方 不經樂壞證者宜服 右為細末煉蜜為丸桐子大都作一 用百勞水下取惡物為度服白點十日 當歸炒乳香 黄斑水蛭首炒桃仁去皮尖 没樂卷一 卷二十四 **孟蟲十四箇** 治一切勞察積滞 服可百九五 百遍乃中 楊

通經九方乃仲景抵當九内加穿山甲廣茂桃仁桂蜜 とううまだす 国 又方衛州張推官在勘院王公以職醫宿直夜口傳此 甘爛水下 勞丸乃是此抵當丸內加人 九婦人傷寒妊娠不可以此九下當以四物湯大 方治人效者不可勝數尋常疑滯其效尤速任衝不 各半湯下之 胡經脈閉塞漸成癥瘕 迎治律絕 参當歸沒樂乳香蜜 ŗ

地黄湯蘇片治病人七八日後兩手脈沉遲細做膚冷 方主之 臍下滿或喜或妄或狂或躁大便實面色黑小便自 未通再服以通為度食前 石細木每服一錢生桃仁七箇細研入酒調下如血 利者此畜血證具也若年老及年少氣虚弱者宜此 當

欠三日里在上 生添湯元 水同煎 右同一處水三升半用慢火熬及二升以來放冷分 抵當湯九其實甚輕也如無地黃與鶇汁計升數 三服投一服至半日許血未下再投之此地黄汤比 型炒黄大黄股子大 松仁麸炒水蛭筒筒去尺大黄一两剉如桃仁半两水蛭十刺汁用刺蒯末一两 藍葉者末一兩 宝蟲以劍刺汁半升如無剷藍葉一握切碎乾重蟲生地黄只用生乾地黃末一兩 生親斤如無生地黄自然汁一升如無生地黄生病自然汁 病人七八日後兩手脈沉細而數或關前 發治準繩 

及宜此 右作一 脈大臍下滿或狂走或喜妄或譫語不大便小便 出應去浑再入鍋投點光生漆一 利若病人年少氣實即血凝難下恐抵當丸力不能 子大 材仁插碎 生地黄十一升 住淨濾去洋放冷作三服每投服候半日許血 處用水三升好酒一 黄三兩半犀角如無汁用犀角 兩 一升慢火熬三升以來傾 為未大黄月 两半再熬之至二 碎雨

活 ていりら にに 添水一 右吹咀每服四錢水 狂者 桃仁 方細末蜜丸桐子大温酒下二三十九治婦 腹皮 同煎 100 服候血 官桂錢芒稍錢大黄 治陽毒傷寒未解 经治準繩 鍾煎至六分去浑温服 服樂如無生地黃 熟結在内恍惚 甘草 盐

多玩四雄全書 服亦可 抵當丸 執也 閉或不調 頭棗肉為丸服之以行諸經者以其内無瘀血故 樂劑寒熟温凉不一惟智者能擇之而不可偏 又法筋骨損傷用左經九之類或用草 及産 岩瘀血已去以復元通氣散加當歸 黑如 心錦 血 當歸尾 四紋 雨者 硝 地 黄 玄丽 明如 粉欲代稳 煎

通真凡 欠足囚事心野 芥子大臨計去枕仰即以津嚥之今停留喉下搜 腸上中焦食遠下焦空心俱桐子大以百勞水煎湯 此樂攻之不動宜去歸地加廣茂酷浸透焙肉桂 血分也諸樂皆獲悍而欲以和劑之也如血老 右為極細末煉蜜丸如桐子大 兩 用歸地者欲下血而不損血耳且引諸樂至 錢錢 人通經男子破血 豉 設治準繩 畜血在上焦丸 坌 如

大内傷丸 治血瘀 炒积實與石菖蒲的一小茴香炒肉桂 甘草炙炒香水煮汁炒 青皮炒川芎 白芍藥炒神麵人養水水油水洗草果炒水瓜 赤麵炒三稜蜜炒香水煮土积殼数黄芩酒炒各厚朴美汁香附重 右為末醋糊丸如桐子大每服六七十九 乾添二兩用瓦杜牛膝二兩大大黃三大大黃三人 人 大黄 五度米醋 桃仁各四兩去 天水末 實妙石菖蒲為一小茴香炒肉桂 白芍藥炒神麵 一四两五

1. ... Jan 101 10 11.10 部内傷方 前樂二十一味共為細末神麵糊丸如彈子大朱砂 右酒水各一種煎八分甚者加重便一種 一兩為衣湯酒任下多不過二九 乳香 花山直分蘇木一线 部不用川通草後穿山甲有吳不用降香為表五分中川通草後穿山甲一致此外降香一致牡丹皮後江西紅麵八香附便製奏芽錢枯 ,出汗各 政治學經 紅梗

多分四月了言 加畫製半夏七分半有孕者油炒 香没藥各七分半 亞治 準繩卷二十四 中部加积殼 卷二十四 脇痛加柴胡 如痛甚加真乳